

情况说明：2022 年《性工作合法化法案》及 性健康相关变化



2022 年《性工作合法化法案》分两个阶段生效：

- 第 1 阶段—自 2022 年 5 月 10 日起
- 第 2 阶段—自 2023 年 12 月 1 日起

常见问题解答

问题: 我是否仍需要提供性健康证明，并每三个月接受一次检查？

回答: 否。维多利亚州的强制检查已于 2022 年 5 月 10 日终止。法律不再要求性工作者每三个月进行一次健康检查或提供证明。

- 2022 年《性工作合法化法案》第 10 条废除了 1994 年《性工作法》第 20A 节。这就说明，自 2022 年 5 月 10 日（第 1 阶段）起，法律不再强制性要求性工作者进行检查，也未要求性工作者每三个月提供一次性健康证明。

- 对于性工作者来说，身体就是商品。坚持常规检查和治疗（包括减少伤害和安全性保护措施）可极大降低感染或传播 STI 或 BBV 的风险。

- 性工作者已经是其自身性健康的专家！研究表明，强制性检查并未发挥作用，而且成本高昂，同时还加深了大众对性工作者是疾病传播媒介的印象。

问题: 在受到性传播感染 (STI) 或携带血液传播病毒 (BBV) (如 HIV) 情况下工作是否仍属犯罪行为？

回答: 否。截至 2022 年 5 月 10 日，在受到 STI 或携带 BBV 情况下工作不再构成犯罪。本次立法修改不再将维多利亚州性工作者感染 HIV 定为犯罪。

- 2022 年《性工作合法化法案》第 9 条废除了 1994 年《性工作法》第 19 和 20 节。自 5 月 10 日（第 1 阶段）起，性工作者在受到性传播感染或携带血源性病毒的情况下工作将不再构成犯罪。这就说明，艾滋病毒感染者从事性工作者将不再被定罪。

- 性工作、HIV 以及其他 BBV 和性传播感染是根据耻辱进行刑事定罪，而不是以证据为基础。对 STI 或 BBV 患者的歧视是不可接受的，这对于获得检查和治疗而言同样造成了障碍。欲了解更多关于性工作者感染 HIV 或任何其他 STI 或 BBV 的信息，请参考由嫣红联盟为性工作者创建的 STI 和 BBV 资源的红皮书。

问题: 工作时不使用安全套是否仍属刑事犯罪？

回答: 由于法律在不断变化，具体取决于如何工作、以及如何解读和执行法律。从 5 月 10 日（第 1 阶段）起，性工作者在不使用避孕套的情况下从事性服务不再构成犯罪。然而，在 2023 年 12 月 1 日（第 2 阶段）之前，法律仍然要求企业主（包括私人工作者），采取合理措施确保使用避孕套。

- 2022 年《性工作合法化法案》第 8 条废除了 1994 年《性工作法》第 18A 节，之前的这项条款曾将性工作者或客户不采取比较安全的性保护措施定为犯罪。新法律将于 5 月 10 日（第 1 阶段）生效，性工作者在不使用避孕套或其他防护屏障的情况下从事性服务不再构成犯罪。
- 在合法化的情况下，性工作者将能够根据个人风险评估对所提供的服务做出选择。性工作者和企业主仍需遵守主流的工作场所健康和安义务。
- 至 2023 年 12 月 1 日（第 2 阶段），2008 年《公共卫生和福利法》仍然有效。这就说明，虽然对性工作者不构成刑事犯罪，但法律仍然要求妓院所有者、伴游机构采取合理措施确保性工作者和客户在工作中使用避孕套。独立/私人工作者也是如此。
- 根据 1994 年《性工作法》，独立和私人工作者目前被列为“豁免的小业主经营者”，并被界定为妓院或伴游机构。作为企业主/经营者，独立和私人工作者在 2023 年 12 月 1 日第 2 阶段之前，仍需遵守 2008 年《公共卫生和福利法》。这就说明，私人工作者需要采取合理措施，确保在工作中使用避孕套。如果出现不合规情况，为了更加了解以上要求，合作伙伴通知和支持部门将进行调查并提供教育和支持。在极少数情况下，法院可以下令处罚或罚款。
- 虽然 2008 年《公共卫生和福利法》中关于性行业的具体规定仍然有效（截至 2023 年 12 月 1 日），为了监测遵守或调查违反该法的行为，授权的官员可进入其认为是妓院、伴游公司、独立/私人工作场所进行调查。
- 2008 年《公共卫生和福利法》规定，妓院和伴游机构的企业主必须确保使用避孕套，而对于这项要求，自 2023 年 12 月 1 日（第 2 阶段）起将予以废除。此后，根据《公共卫生和福利法》规定，法律未强制要求妓院所有者、伴游机构和独立/私人工作者在工作中使用避孕套。坚持使用避孕套仍然被认为是最佳做法。2004 年《职业健康和安法》仍规定有义务确保工作场所健康和安。

性工作者性健康信息

问题：我是否有感染性传播感染 (STI) 或血源性病毒 (BBV) 的风险？

回答：任何有性行为的人都会有感染的风险，由于性工作者是最初的安全性行为专家，保护自身不受 STI 和提供相对安全的性服务是其在工作中需要注意的。

- 多数研究证明，与非性工作者相比，性工作者的 STI 和 BBV 发病率相同甚至更低。主要原因在于性工作者在工作中会采取预防措施，比如使用避孕套以及其他个人防护设备 (PPE)，而且会定期检查并在必要的情况下接受治疗。

问题：我需要注意哪些 STI 和 BBV？

回答：性传播感染或称 STI，包括衣原体、生殖器疣和 HPV、疱疹（唇疱疹）、淋病、梅毒。血源性病毒或称 BBV，包括甲肝、乙肝、丙肝和 HIV。

- 随着衣原体和淋病的发病率有所增加，我们必须继续实行预防战略，例如使用避孕套和进行客户检查；定期进行检查，并在必要的情况下接受治疗。
- 由于性工作者的领导和迅速行动，性工作者在实现较低的 STI 和 BBV 传播率，以及较高的性健康检查和治疗率方面都取得了成效。经过 20 世纪 80 年代的宣传，受 HIV/AIDS 流行影响的社区迅速组织并推动 HIV/AIDS 预防和治疗方案，其中包括“伙伴关系方法”，这一方案认为社会地位相同的群体和受影响社区在战略内容中占有重要地位。这样一来，社会地位相同的基于社区的群体便能够在应对 HIV/AIDS 时，领导、设计和提供预防和教育方案。

问题: 为什么常规检查和治疗至关重要？

回答: 这样能帮助我们减少伤害策略。

- 应与医生或护士讨论检查频率，确定哪种方法最适合个人性工作者。如需指南，您可以在[此处](#)查看建议的检查时间表。
- 检查频率应根据其从事的性工作类型、提供的服务以及潜在的性风险和症状来确定。
- 另外，要了解无需在同一时间进行所有检查，这一点也很重要。

请访问此[链接](#)，查找理想的医疗服务或联系 Vixen 讨论[\[链接\]](#)。
如果您确实患有 STI 或 BBV，可选择治疗方案。

如果您是携带 BBV 的性工作者或感染了 STI，您可参阅红皮书中关于每种 STI 和 BBV，及其相关条件和治疗选择的信息。

问题: 我在工作中应该使用哪些安全性行为工具 (SST)？

回答: 有多个选项供您选择，您可以选择最适合自己的选项。避孕套和口交保护膜是保护免受性传播感染 (STI) 或血源性病毒 (BBV) 感染最为有效的策略。

- 最常用的 SST 是安全套，有助于防止性生活时体液的交换。避孕套可能会滑脱或断裂，因此使用正确贴合阴茎的避孕套非常重要，在可行的情况下，可以在工作期间检查其是否仍在正常使用。为尽量减少避孕套破裂，最好使用水基润滑剂和/或硅酮基润滑剂。在乳胶避孕套上使用油基润滑剂会损坏避孕套并使其破裂。如果避孕套滑落或破裂，请与当地的性健康诊所联系，寻求治疗或进行性健康检查。您可以访问本指南，[点击此处](#)了解如何处理安全套破裂的问题。
- 一些性工作者也喜欢使用内嵌式避孕套（女性安全套或称女用避孕套），这种安全套与普通安全套一样，只不过是戴在内部。同样，需要在内嵌式安全套的内部涂上大量润滑油，以防破损。
- 口交保护膜是矩形的乳胶薄片，通常可以增香。它们用于阴道、肛门和口腔保护，使用方法是将其拉拽到生殖器区域上再将其固定在适当的位置。

有许多管理风险的方法，您可根据工作方式避免感染上述任何 SST。如果您从事或觉得自己从事“自然”或无保护的服务，请点击此链接了解降低风险的方法。

问题:什么是“健康检查”，我如何在工作中进行检查？

回答:具体根据您工作的部位和方式而异，但简而言之，包括检查客户的生殖器部位，包括臀部和嘴，以此确保没有明显的 STI 迹象。

- 在工作中，“健康检查”是性工作者减少伤害策略的重要组成部分。例如，检查破损皮肤、疮、溃疡或“异常”分泌物。
- 在一些妓院中，您可以向管理层学习如何进行健康检查，或者向其他员工学习。性工作者也可以在工作中自学，[或者联系 Vixen \[链接\]](#)。红皮书涵盖广泛的同行资源，概述了相关网站、要搜寻的图视化示例，以及如何给阴茎“挤奶”。
- 如果您怀疑客户患有 STI，可采取其他有效措施（无需取消预订）。例如，提供类似“表演”或手淫的替代服务。请参阅红皮书了解更多信息。

如果您认为客户患有 STI，您可能需要考虑制定一个行动计划。例如，在妓院或按摩院工作时，您需要考虑寻找值得信任的同事进行二次检查，还要考虑在出现需要取消或更改预订的情况下，管理层是否会提供支持。

问题:什么是 PrEP 和 PEP，我具备使用资格吗？

回答:[接触前预防 \(PrEP\)](#) 是 HIV 阴性人群使用的抗逆转录病毒药物，可大大降低接触时感染 HIV 的风险。[PEP 针对的是可能接触 HIV 的 HIV 阴性人群](#)。在性工作环境中接触 HIV 并非开具 PEP 处方的唯一理由。医生或护士会评估是否应该给您开具 PEP。欲了解更多关于 PrEP 和 PEP 的信息，请查阅嫣红联盟红皮书。

- HIV 的预防已经取得了长足的进步，正确使用接触前预防 (PrEP) 或接触后预防 (PEP) 即可预防。
- PrEP 在任何潜在接触 HIV 之前服用，通常每天、持续或按需服用（按需使用 PrEP 目前仅推荐用于与男性发生性行为的顺性别男性）。
- 对于所有存在感染 HIV 风险的人群，例如男男性行为者 (MSM)、变性人、同性恋者和注射有 HIV 风险药物的人群，建议将每日服用 PrEP 作为一种有效的 HIV 预防策略。
- PEP 是一种短疗程的 HIV 药物，如果在接触 HIV 的 72 小时内服用，可以显著降低感染 HIV 的几率。

资源

[【访问其他 Vixen 情况说明】](#)

[【访问 DJCS 情况说明】](#)

[【访问 DH 情况说明】](#)

[【访问 VEOHRC 情况说明】](#)

[【红皮书\[链接\]】](#)

[有关 Vixen 服务的更多信息\[链接\]](#)